

体温怎么量比较准_怎样量体温-股识吧

一、怎样量体温

将体温表甩至35 以下。

将体温表见到腋下，5分钟后就知道多少度了。

二、腋下体温计要怎么量比较准？

一般都是用左手 5分钟左右吧 不用加0.5的 一般成人的体温是36度至37.5度

三、什么时间怎么量体温最准

早上醒了什么事都不干量体温最准确。

叫基础体温。

四、如何用红外线体温计给婴儿测体温最准确

一般都是用左手 5分钟左右吧 不用加0.5的 一般成人的体温是36度至37.5度

五、问一下宝宝的体温在那里量最标准呢？

还有一种是量额头的，放在额头就很快可以测出体温，你可以在网上找找看。

六、如何用红外线体温计给婴儿测体温最准确

儿童量体温最好不要用红外的，安全点，还是用电子的好，如果家庭用的话，可以用水银探热针

七、什么样的体温表最准？怎样量？

买测试直肠的温度表。

直肠的温度最接近身体真是温度常见测体温的温度计有三种，一种是测腋窝温度，这是最简单也是最不准确的，还有一种是测口腔温度，操作较方便，测量较准确，还有一种就是测直肠的温度了，这是操作最难但最准确的具体操作看说明书

八、怎样正确测量体温？

体温测量常用的方法有口腔测量法、腋下测量法和肛门测量法三种。

用于口腔测量的体温表叫口表，用于腋下测量的体温表叫腋表，用于肛门测量的体温表叫肛表。

无论用哪种测量方法，测量前都应将体温表内的水银柱甩至35℃以下。

测量体温的具体方法如下：（1）口腔测量法：将口表消毒、擦干，将水银头端放于患者舌下，让患者紧闭口唇，切勿用牙咬，也不要说话，以免体温表被咬碎或脱落。

3分钟后取出，在光亮处，将体温表横持，并慢慢转动，观察水平线位置的水银柱所在刻度。

正常的口腔温度为36.2～37.2℃。

（2）腋下测量法：擦干患者腋下，将腋表轻轻放入患者腋下，使水银头端位于腋窝的顶部，让患者夹紧腋窝。

5～10分钟后取出，查看方法同口表。

正常腋下体温为36～37℃。

（3）肛门测量法：让患者屈膝侧卧或俯卧，露出臀部，将涂有凡士林或肥皂液的肛表水银端，轻轻插入肛门内约3～4厘米。

3分钟后取出，用软纸擦净体温表后，读出体温刻度。

正常肛门体温为36.5～37.7℃。

九、把体温表放在身体哪个部位测量体温最准确？

测量体温主要有三个地方：口腔、腋下、肛门。
口腔的体温偏高，腋下的体温偏低，肛门测量的体温是最准的。

参考文档

[下载：体温怎么量比较准.pdf](#)
[《股票理财资金追回需要多久》](#)
[《德新交运股票停牌多久复牌》](#)
[《股票开户最快多久能到账》](#)
[《蜻蜓点睛股票卖出后多久能取出》](#)
[《大股东股票锁仓期是多久》](#)
[下载：体温怎么量比较准.doc](#)
[更多关于《体温怎么量比较准》的文档...](#)

声明：
本文来自网络，不代表
【股识吧】立场，转载请注明出处：
<https://www.gupiaozhishiba.com/article/24116183.html>