

腋下量温度怎样比较准确--怎样测量体温最标准-股识吧

一、测量体温口腔和腋下哪个比较准确

口腔和腋下在正确操作下测量体温都是准确的。

每次用腋温测时，中间不能间断，必须一直加紧体温计至10分钟才是最准确的。

若是以口腔测量的话不可饮食、交谈、以使口腔内体温稳定。

体温测量是诊断疾病时常用的检查方法，有口腔测温、腋下测温和肛门测温三种。

正常值体温：口腔温度是36.5 至37.5 ，腋下比口腔低0.5 ，肛门比口腔高0.5

。

异常结果：口腔温度不在36.5 至37.5 ，腋下不在36-37 ，肛门不在37-38 。

扩展资料：正常人的体温是相对恒定的，它通过大脑和丘脑下部的体温调节中枢，调节和神经体液的作用，使产热和散热保持动态平衡。

在正常生理状态下，体温升高时，机体通过减少产热和增加散热来维持体温相对恒定；

反之，当体温下降时，则产热增加而散热减少，使体温维持在正常水平。

正常体温不是一个具体的温度点，而是一个温度范围。

机体深部的体温较为恒定和均匀，称深部体温；

而体表的温度受多种因素影响，变化和差异较大，称表层温度。

临床上所指的体温是指平均深部温度。

一般以口腔、直肠和腋窝的体温为代表，其中直肠体温最接近深部体温。

人体正常体温平均在36~37 之间，超出37.1 就是发热，37.3~38 是低烧，38.1~40 是高烧。

40 以上随时有生命危险。

参考资料来源：股票百科-体温测量参考资料来源：股票百科-正常体温

二、腋下量体温什么时候量最准？要怎么量量几分钟 如何读数要加0.5吗？

把体温针上面的温度降低于36度然后放在腋下中间的位置夹住，至少五分钟。再拿出来看那先只到哪里就是多少度。

三、怎样测量体温最标准

腋下是+0.5呢 一般宝宝量体温就是用肛表量呢 那样量的温度比较准确的

四、怎么量腋下体温，是加0.5度还是减0.5度啊？

腋下是+0.5呢 一般宝宝量体温就是用肛表量呢 那样量的温度比较准确的

五、怎样测量体温最标准

体温计测量时间：测量体温有多种方式，测量的时间各不相同：腋下测量，测温7-10分钟取出。

正常腋下体温一般平均为36-37 。

肛门内测量，3-5分钟后取出，肛门体温的正常范围一般为36.8-37.8 。

口腔内测量，3分钟后取出，一般成人正常口腔体温在36-37 之间，小儿可高0.5

。

参考文档

[下载：腋下量温度怎样比较准确.pdf](#)

[《股票被炒过要多久才能再炒》](#)

[《股票跌停板后多久可以买入》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

[《股票停牌重组要多久》](#)

[下载：腋下量温度怎样比较准确.doc](#)

[更多关于《腋下量温度怎样比较准确》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/31387956.html>