

冬天量体温哪里比较准温度计在哪里量更准确-股识吧

一、测量体温口腔和腋下哪个比较准确

口腔和腋下在正确操作下测量体温都是准确的。

每次用腋温测时，中间不能间断，必须一直加紧体温计至10分钟才是最准确的。

若是以口腔测量的话不可饮食、交谈、以使口腔内体温稳定。

体温测量是诊断疾病时常用的检查方法，有口腔测温、腋下测温和肛门测温三种。

正常值体温：口腔温度是36.5 至37.5 ，腋下比口腔低0.5 ，肛门比口腔高0.5

。

异常结果：口腔温度不在36.5 至37.5 ，腋下不在36-37 ，肛门不在37-38 。

扩展资料：正常人的体温是相对恒定的，它通过大脑和丘脑下部的体温调节中枢，调节和神经体液的作用，使产热和散热保持动态平衡。

在正常生理状态下，体温升高时，机体通过减少产热和增加散热来维持体温相对恒定；

反之，当体温下降时，则产热增加而散热减少，使体温维持在正常水平。

正常体温不是一个具体的温度点，而是一个温度范围。

机体深部的体温较为恒定和均匀，称深部体温；

而体表的温度受多种因素影响，变化和差异较大，称表层温度。

临床上所指的体温是指平均深部温度。

一般以口腔、直肠和腋窝的体温为代表，其中直肠体温最接近深部体温。

人体正常体温平均在36~37 之间，超出37.1 就是发热，37.3~38 是低烧，38.1~40 是高烧。

40 以上随时有生命危险。

参考资料来源：股票百科-体温测量参考资料来源：股票百科-正常体温

二、温度计在哪里量更准确

对于测量体温，可测口腔、腋下、直肠。

其中直肠最接近人体内温度，但由于测量不便，一般测量腋下温度（此属体表温度、略低），因此一般测出腋下温度后加0.5度

三、体温表放在哪量比较准

体温表（肛表）插入肛门测得肛温最接近体内温度，但不方便。

一般比口腔温度高0.3 ~ 0.5 。

体温表（口表）测得口腔温度，比较接近体内温度，但有危险，特别是小儿禁止使用。

正常值为：36.3 ~ 37.2

体温表（腋表）测得腋下体温，只反映体表温度，但很方便，所以普遍使用。

腋窝温度较口腔温度低0.3 ~ 0.6

四、小孩发烧量体温量哪里比较准确?

腋下温度加上0.5度代表体内温度，只要在 36.2-37.5都是正常的温度.正常情况下人体每天可以有0.5-1度的波动.测量的时候一定测量10分钟，而且一定要夹紧，保证测量准确啊.

五、四个月宝宝应该在哪里量体温最准确，且易量

宝宝测体温都是测腋下的，建议用传统的水银体温计会准确些。

把体温计夹在宝宝腋下8-10分钟，如果是衣着多的话，要注意散热以免影响测温结果

六、量体温量哪最准？

新生儿测量体温的话，可以用电子体温计，速度比较快，一分钟就可以搞定，可以选择在宝宝的脖子处，或是腋窝处进行测量，也可以通过口腔进行测量的。

参考文档

[下载：冬天量体温量哪里比较准.pdf](#)

[《股票发债时间多久》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[《股票一般多久一次卖出》](#)

[《股票多久才能卖完》](#)

[下载：冬天量体温量哪里比较准.doc](#)

[更多关于《冬天量体温量哪里比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/50596105.html>