

为什么躺着量血压比坐着量低很多：为什么躺着量血压低坐起来就高-股识吧

一、为什么我平躺测量血压和坐着测量血压值不一样，躺着正常，坐着高压140，低压90

坐着与躺着的血压即便有一点偏差，但差的不会太多的。你这个已经是临界高血压了，所以建议你目前继续观察你的血压。最好坐着量。躺着呢，全身会相对比较放松，所以血压可能会比坐着偏低一些。

二、躺在床上量血压与坐着量有误差吗

有误差，躺着量血压比坐着量血压，测量的血压值会低。

三、为什么人的血压躺着比坐着低

躺着心脏到人体最高点的高差就小了，也就不需要使那么大的劲了。

四、为什么我的血压坐着量和躺着量相差20-30

一般情况下电子血压计较台式血压计误差较大，你可以试用台式血压计来检测血压，测试的最佳时间是清晨醒来，躺在床上，测试部位肘窝关节内侧动脉搏动处。记住一定要每一天同一个时间测试，只有这样，你才能够判断你的血压是否稳定。

五、为什么躺着量血压低坐起来就高

坐着是标准的测量体位，实在不能坐才会躺着量。
正常血压范围是指坐姿量的。
这个要明白。

六、在家里帮我爸量血压。躺着量时为什么比坐着量的血压高出很多？

问题分析：你好，血压测量是要在血压计与心脏处于同一水平测量的，如果不在一个水平，测值是不准确的。
另外也有体位性低血压的患者、体位性高血压的患者。
意见建议：另外血压在左右侧肢体也是不同的，右上肢的血压都高于左上肢，所以临床都以右上肢的血压为准。
另外测量血压也要在患者安静状态下测量，否则也是不准的。

七、为什么我的血压坐着量和躺着量相差20-30

一般情况下电子血压计较台式血压计误差较大，你可以试用台式血压计来检测血压，测试的最佳时间是清晨醒来，躺在床上，测试部位肘窝关节内侧动脉搏动处。记住一定要每一天同一个时间测试，只有这样，你才能够判断你的血压是否稳定。

八、水银血压计躺着和坐着量血压为什么不一样？

通常这样测量是得不到贴切的数值的，因为临床测量的数据通常需要心脏的高度和胳膊的高度近似，而且坐姿要正规。电子血压计也是要坐着测量的标准。

参考文档

[下载：为什么躺着量血压比坐着量低很多.pdf](#)

[《有放量的股票能持续多久》](#)

[《法院询价评估股票要多久》](#)

[《股票账户办理降低佣金要多久》](#)

[《股票多久能买完》](#)

[下载：为什么躺着量血压比坐着量低很多.doc](#)

[更多关于《为什么躺着量血压比坐着量低很多》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/63550648.html>