

量血压老是二比加压怎么回事 - 电子血压计连续二次测量结果为何差很多？-股识吧

一、电子血压计在测量血压的时候为什么启动两次?????? ??

应该启动一次 若启动两次代表前一次没抓到讯号 再来一次

二、血压一天2变是怎么回事

人的血压和心情，气候，活动都有关系，并1天内早，中，晚血压都能不同
量血压时最好每天定时量，量同1只手

三、欧姆龙电子血压计，上臂式，为什么会两次加压，准吗

一般正常情况下二次加压都是高血压患者，血压比较高一次加压后达不到测量要求。

四、频繁测量血压

测血压过程中会影响手臂的供血，但是总体来讲对身体影响不大。
尽量不要过于频繁的测量，要是为了监测血压也就每天测一次就可以了。

五、电子血压计连续二次测量结果为何差很多？

用电子血压计测血压，为啥每次结果相差很多？这个问题要注意

六、血压一次比一次高是怎么回事，我测第一次会比第二次高，第三次比第二次高，请问是怎么回事

你好，那就是血压器的问题或者是医生的问题了！

七、高血压一天的血压都高吗？就是说一天24小时平均值高于正常值

穆药师提醒你：对高血压患者进行的24小时动态监测发现，一天中有两个血压高峰和两个低谷。

早晨5—8点为第一个血压高峰；

8点以后开始下降，中午12—13点为第一个低谷；

然后血压开始上升，18—20点为第二个高峰，也是全天血压最高时期；

然后血压下降，到凌晨时为全天最低点，也就是第二个低谷。

接着血压逐渐上升，再进入次日的第一个高峰，按照24小时血压监测曲线图分析：

1. 约70%的患者为双高峰型。

2. 约25%的患者仅出现下午一个高峰。

3. 少数患者以早起第一个高峰最为突出，这类病人往往不易被常规检查所发现。

4. 部分高血压患者仅表现为白天血压升高，而另有部分患者白天与夜间均升高。

临床上常见到这种现象，有些病人虽然认真服药，平时效果不错，但仍然发生心脑血管急症。

主要是因为这些患者服用的药物为短效降压药，且未按血压波动规律用药。

因为短效降压药药效只能维持几个小时，到次日清晨时，血药浓度已很低甚至全无，加上不及时用药，早起时第一个血压高峰是无法得到控制的。

要使全天血压得到合理的控制，使24小时血压平稳，一定要按照血压波动规律及降压药物在体内作用时间合理用药。

一天中第一次用药时间要在早上6点起床时；

如果服用的是中效降压药，应在下午5—6点时服第二次。

对于清晨血压升高者，将清晨血压控制在正常水平以下，以减少心脑血管疾病的急性发作，选用钙拮抗剂、受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂等降压药物。

夜间血压升高者不适合用短效药物，最好应用长效的或中效的降压药物，在睡前或午夜给病人服用降压药物，能够达到理想的效果。

另外，血压得到控制后，最好到医院用24小时动态血压监测来鉴定血压是否平稳。

参考文档

[下载：量血压老是二比加压怎么回事.pdf](#)

[《股票还要回调多久》](#)

[《同花顺股票多久提现》](#)

[《股票腰斩后多久回本》](#)

[《大冶特钢股票停牌一般多久》](#)

[下载：量血压老是二比加压怎么回事.doc](#)

[更多关于《量血压老是二比加压怎么回事》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/26034044.html>