

# 腋下量体温比实际体温差多少~左右腋下体温不一样，相差多少算正常-股识吧

## 一、求额温计与真实体温对照表

额温计不太常见，因此很少有对照表。

直肠正常值 36.9 ~ 37.9 测量时应插入直肠6cm以上。

口腔 36.7 ~ 37.7 测量时应放于舌下。

腋窝 36.0 ~ 37.4 测量时至少需要10分钟，并且腋下保持干燥。

## 二、腋下量体温多少度算发烧？

腋下体温 37.1 度是最高限。

超过了就算发烧。

## 三、腋下体温和口腔体温差别

展开全部口腔的温度更准确些。人的体温会随着时间的变化而变化的，早晨的体温和晚上的体温也各不相同。

## 四、腋下量体温多少度是正常

测量体温一般常用3个部位，即口腔，腋窝及肛门。正常体温在肛门处为 36.5 ~ 37.5 之间；

在口腔处为 36.2 ~ 37.3 之间；

在腋窝处为 35.9 ~ 37.2 之间。通过测量后，凡超过正常范围 0.5 以上时，称为发热。不超过 38 称为低热，超过 39 者为高热。

## 五、左右腋下体温不一样，相差多少算正常

0.5度都是正常的

## 六、腋下量体温是要加5分么？误差是多少阿

不用，量出来多少就多少，36.5~37.5为正常

## 参考文档

[下载：腋下量体温比实际体温差多少.pdf](#)

[《胜诉冻结股票之后多久可以执行》](#)

[《创业板股票转账要多久》](#)

[《股票冷静期多久》](#)

[《股票变st多久能退市》](#)

[下载：腋下量体温比实际体温差多少.doc](#)

[更多关于《腋下量体温比实际体温差多少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/44011716.html>