

阿莫西林口服量跟体重的比例是多少呢...8个月母哈士奇吃阿莫西林吃多少-股识吧

一、8.5公斤大婴儿吃阿莫西林克拉维酸钾14：1干混悬剂具体用量

按公斤体重计算，=（成人用量/60）*小孩的体重。

二、请问12岁孩子100斤体重，吃2粒每粒250mg的阿莫西林，过量了吗，心里很忐忑，恳请回答！

展开全部病情分析：你好，阿莫西林克拉维酸钾针适用于上、下呼吸道感染，泌尿系统感染，皮肤及软组织感染的治疗，其它术后感受染的预防等。

意见建议：需要根据宝宝的公斤体重来计算，3个月~12岁儿童，常用剂量为每8小时一次，每次每公斤体重30毫克。

严重感染者可增加至每6小时一次，每次每公斤体重30毫克。

三、8个月母哈士奇吃阿莫西林吃多少

8个月的基本上成长了。

不知道是公母？正常体重有40斤左右了，建议是儿童量。

或者是一次一支。

四、阿莫西林一天最大剂量

1.口服：成人1次0.5g，每6~8小时1次，每日剂量不超过4g；

小儿每日20~40mg/kg，每8小时1次服用。

治疗无并发症的急性尿路感染可予以单次口服本品3g即可，也可于10~12小时后再

增加一次3g剂量。

单次3g剂量也可用以预防感染性心内膜炎或治疗单纯性淋病，前者于口腔内手术(如拔牙)前1小时给予，后者常加用丙磺舒1g。

新生儿和早产儿一次口服50mg，12小时1次；

感染严重者可每8小时1次。

晚期肾功能衰竭病人本品的半衰期可自正常的0.9~2.3小时延长至5~20小时；因此在肾小球滤过率为10~50ml/min和小于10ml/min时的病人，其给药间期应分别为8~12小时和16小时。

血液透析可影响血药浓度，每次血液透析后应予以1g阿莫西林。

2.肌肉注射或稀释后静脉滴注，1次0.5~1g，每日3~4次；

小儿每日50~100mg/kg，分3~4次静脉滴注。

口服：成人及体重超过40公斤的儿童每次1-2粒(0.25-0.5g)，每6-8小时1次，一日剂量不超过4g(16粒)；

体重小于40公斤的儿童按体重20-40mg/kg/日，分2-3次服用；

三个月以下婴儿30mg/kg/日，分次服用，每12小时1次；

肾功能严重损害患者需调整给药剂量，其中内生肌酐清除率为10~30ml/分钟的患者每12小时0.25~0.5g。

本品可在空腹或饭后服用，并可和牛奶等食物同服。

奈瑟氏淋球菌尿道炎可单次口服本品3g；

。肌肉注射：0.5-1g/次，一日3-4次。

静脉滴注：0.5-1g/次，一日3-4次。

五、请问12岁孩子100斤体重，吃2粒每粒250mg的阿莫西林，过量了吗，心里很忐忑，恳请回答！

一般药物的使用剂量表明是成人、儿童的，实际上剂量是按体重给的，你儿子虽然才12岁，但体重达到了成人的标准，按照成人的剂量服用应该没事，再说阿莫西林是OTC类药物，稍微过量应该没事，但抗生素类药物最好不要滥用

六、阿莫西林和肠康片同吃？

这两种药可以一起吃，最好都吃在饭后，减少对胃的伤害，希望可以帮到你。

七、阿莫西林颗粒0.25g，小儿一日剂量按体重20~40mg/kg每8小时1次，我女儿12公斤一次吃多

吃一袋的三分之二

参考文档

[下载：阿莫西林口服量跟体重的比例是多少呢.pdf](#)

[《周五股票卖出后钱多久到账》](#)

[《msci中国股票多久调》](#)

[《股票保价期是多久》](#)

[《股票账户重置密码多久生效》](#)

[《法院裁定合并重组后股票多久停牌》](#)

[下载：阿莫西林口服量跟体重的比例是多少呢.doc](#)

[更多关于《阿莫西林口服量跟体重的比例是多少呢》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/38780850.html>