

量血压哪个手指比较准最准__量血压量哪只手-股识吧

一、左手和右手的血压哪只测出来准确

左手一般情况下人的右手血压比左手血压是要高10~20mmHg。

这是因为测量血压时测的是肱动脉的血压。

右手肱动脉来自头臂干的分支，左手肱动脉来自左锁骨下动脉。

而头臂干和左锁骨下动脉都来源于主动脉，头臂干是主动脉的大分支，所以头臂干的血压自然比左锁骨下动脉要高，测量的右肱动脉就比左肱动脉血压要高了。

正常双侧上肢血压差别在5--10mmHg，若超过此范围，属于异常。

见于多发性大动脉炎或先天性动脉畸形等。

所以，测左侧还是右侧，一般来说，差别不会很大。

二、你好，请问量血压应该量哪个手？

通常情况量血压是量右手。

三、血压量哪只手准些

不分，只是医生要考虑到两手有区别，活动多的手偏高。

四、量血压量哪只手

展开全部人的血压在不同的情况下`会有`变化，测血压一般是右手，再测血压的时候`要休息5分钟左右再测，而且最好`测量4次，然后取其平均值，可以再去找医生给你测一次，应该没问题.....

五、测那只手血压才标准?

离心脏近的那只胳膊，也就是左胳膊

六、测量血压是以哪只手为准，为什么两只差别

建议：测量血压通常以测量右上臂血压为主，如双上肢血压差别大于15mmHg属于病理状态，可见于动脉硬化、大动脉炎等。

七、用电子血压计一般量左手还是右手

您好！嘉道医疗wang左右两个胳膊的血压不一样是正常的，您不要担心。因为血压测量的是动脉血压，动脉血液会随着离心脏越远，越来越低。左右两胳膊离心脏的距离不相同，所有血液会有一些差别，但是影响并不是很大，临床上测量时一般要胳膊要求与心脏在同一水平线上测量。如果测量值不超过10mm汞柱，都是正常的。

八、为什么两只手测出来的血压是不一样的，那只手测出的比较准确，不准确那只是不是就可以不去管他

左右胳膊血压就是不一样的，有差距，个体差异，如果没有其他的症状，是正常的。

如果有头晕，气短，胸闷等症状，建议到医院进一步检查：心电图，脑血流图。因为从心脏出来的血到两上肢的血管不一样，即分支有别的，同双上肢活动有别，两侧可有0.66-1.3kPa(5~10mmHg)的差别。测量血压规定一般以右臂为标准血压。

参考文档

[下载：量血压哪个手指比较准最准.pdf](#)

[《股票跌停多久退市》](#)

[《股票填权后一般多久买》](#)

[《购买新发行股票多久可以卖》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[下载：量血压哪个手指比较准最准.doc](#)

[更多关于《量血压哪个手指比较准最准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/19621420.html>