

药流三天流鲜红色血比月经量多怎么办--药流后大概三天吧！出血就少了，隔天就跟月经量一样多还有血块，八天了还有血，是子宫收缩么？正常么？-股识吧

一、药流后月经量过多怎么办？

1.请用---<

[护舒宝]>

---大种止血贴.2.请忌食花生牛肉等高脂食物.3.请定时去医院复检...

二、药流第三天晚上血流很多比月经多一点。今天早上没流？正常吗？

流产后出血因人而异，出血超过7天时应在医生指导下服用抗生素预防感染。

出血超过两周仍淋漓不止者，应到医院查明原因，必要时行清宫术。

药流之后最好搭配服用益母草颗粒，可以辅助清宫，建议你现在开始服用，同时注意饮水，适量活动，加速血药代谢，以尽快恢复激素水平

三、药流后第三天开始出血量多是怎么回事

没事，我也是这样，我周二流的，昨天还肚子疼的厉害，血量也多，咨询医生了，说近期这样正常，今天就好多了，我是学生，也是天天坐很久，注意坐着腰后垫个东西，不然以后会落病根，多喝益母草，颗粒和膏混着喝，用开水冲，喝烫的，按说明书的两倍喝，有助于排尽宫内剩余组织与恶露

四、药物流产三四天了，肚子怎么有时还是有点痛，而且经血量跟平常比也多多了，是不是哪里出问题了，今天又给感冒又咳嗽了

首先考虑药流不全。

所谓的药流是指在怀孕早期不须手术、而用打针或服药的方法达到人工流产，但是药流最怕的就是出现药流不全。

药流不全的症状常常会表现为在药流后出血量超过月经量，出血时间超过2周，明显腹痛等。

如出现这些症状后应及时到医院进行检查治疗。

一般正常情况下，药流后出血的时间是1-3个星期，其表现是出血量逐渐减少；如果出血减少后又增多或一点都不减少或逐渐增多，都是不正常的，应及时去医院做B超检查。

如果确定是的话就要清宫，把子宫内的残余物清除，所以一定要认真对待药流，不可随意在家中自行流产，出现问题后及时就医。

五、药流后大概三天吧！出血就少了，隔天就跟月经量一样多还有血块，八天了还有血，是子宫收缩么？正常么？

药流要注重平时饮食，很可能会影响身体的恢复，注意冷，辛辣的禁时，八天出血还算，还要等一个过度期，药流比人流更损身体，建议补血滋肾。

六、药流后血太多怎么办？

流产后的最初2~3天，阴道流血量一般相当于月经量或略多于月经量，若阴道流血量很多或持续不净要及时就诊。

药流后出血的原因和处理

药流后的出血一般在1-3周，总的表现是：出血一天比一天少；

如果出血减少后又增多或一点都不减少或逐渐增多，都是不正常的，常见的原因如下：1.不全流产：药流后出血的主要原因，一般要通过妇科检查和B超可以判断2.

药流后感染：如果B超的判断是子郅攻策纪匕慌察苇畅俩宫内没有残留，那么要考虑子宫内的感染，因为流产所出的血是细菌的很好的培养基。

如果情况严重在妇科检查时子宫会有压痛，还会有发热等3.血液凝固功能不好：某些人在轻微碰、夹后容易出现瘀斑或起包，那么可能这人的血液凝固功能不是太好，在药流或人流时，可以有大出血或流血时间长等。

处理：因为原因众多，最好到医院做详细检查后判断

参考文档

[下载：药流三天流鲜红色血比月经量多怎么办.pdf](#)

[《股票冷静期多久》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

[《股票停牌多久能恢复》](#)

[《股票放多久才能过期》](#)

[下载：药流三天流鲜红色血比月经量多怎么办.doc](#)

[更多关于《药流三天流鲜红色血比月经量多怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/25108631.html>