

测血压坐着量比躺着量低有问题吗怎么办！血压连续测量，越量越低正常吗-股识吧

一、躺在床上量血压与坐着量有误差吗

都准！躺着和坐着血压是不一样的！躺着时血压会低一点，坐着就会高一点！你多做几次就会相信我说的话了！最好看医生，听医生的为宜！祝你爸爸身体安康，一切顺畅！

二、量血压应该坐的还是躺的

研究人员对100位年龄介于18岁至88岁的患者的血压进行了不同方式的测试(两种胳膊位置：小臂与身体形成直角和胳膊与身体平行，坐着、站着和躺着)。所有患者来看病的原因是因为感冒或头疼，均不是直接因为心脏问题。研究人员对每个患者的血压进行了六次测量，在坐着用胳膊呈直角姿势测量血压的患者中，测量结果显示有22%的人患高血压。而在用胳膊与身体平行姿势测量血压的患者中，结果显示患有高血压的人数为前者的一倍。研究人员表示，胳膊的位置对获取较为科学的血压读值很重要，但现在还很难断定哪种姿势更为正确。然而根据美国心脏协会的要求，患者量血压时应取胳膊与身体呈直角的姿势。

三、为什么我的血压越量越低

您好，由于血压具有明显的波动性，你描述的症状是一种正常的现象.如果连续测血压的话，就会出现不准确的情况.就像你描述的那样，所以临床一般不会采取连续测血压

四、躺在床上量血压与坐着量有误差吗

有误差，躺着量血压比坐着量血压，测量的血压值会低。

五、什么是收缩压 高血压 收缩压躺着量和坐着量不一样，是体位性高血压吗

24小时动态血压监测必要性 有研究表明单纯采用诊室血压管理高血压患者既可能高估血压控制情况，又可能低估血压控制情况，不仅造成医疗资源的浪费，也非常不利于患者的健康。

如果仅仅根据诊室血压是否低于140/90mmHg判断血压达标情况，血压控制率

六、躺着的血压是130，85，坐着量得血压106，66，这是正常的吗？

如果没有其他不适感觉和症状，那一切正常。

七、躺在床上量血压与坐着量有误差吗

有误差，躺着量血压比坐着量血压，测量的血压值会低。

八、血压连续测量，越量越低正常吗

你好，血压是不固定的，但相差也不会太大，受很多环境因素的影响，如运动、心情不好及情绪激动、精神紧张都会造成血压的变化，可以在一天的不同时间测量，看看是否异常。

九、为什么坐着测得的血压比躺着测得的血压高，我已经观察

坐着量血压，多数比躺着，要高些的，建议24小时动态血压监测

参考文档

[下载：测血压坐着量比躺着量低有问题吗怎么办.pdf](#)

[《股票15点下单多久才能交易》](#)

[《股票改名st会停牌多久》](#)

[《定增股票一般需多久》](#)

[《股票改手续费要多久》](#)

[《法院裁定合并重组后股票多久停牌》](#)

[下载：测血压坐着量比躺着量低有问题吗怎么办.doc](#)

[更多关于《测血压坐着量比躺着量低有问题吗怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/36526360.html>