

# 孕34周血浆量比未孕时增加多少 - 怀孕第一个月后女性的血液循环系统发生了什么变化?-股识吧

## 一、怀孕第一个月后女性的血液循环系统发生了什么变化?

我在33周的时候，宫高也是33，腹围96，现在38周时，宫高37，腹围102，医生也没说什么.[ :em27 : ]

## 二、怀孕第一个月后女性的血液循环系统发生了什么变化?

母体的血液循环是胎儿一切生理需要得到满足的保证?从妊娠6周起，母体血容量开始增多，孕32~34周达高峰，比怀孕前增加35%，平均血容量在1400毫升左右?其中血浆约占1100毫升，红细胞约占300毫升，血液变得稀释，血红蛋白由未孕时的130克/升下降为110克/升，血清内蛋白量也有所下降?为了减少分娩时出血，妊娠期凝血因子多有增加，其中纤维蛋白原比怀孕前增加50%?怀孕时由于子宫增大使膈肌上升，心脏向上?外?前移位?随妊娠周数的增加，心肌变得更肥厚，其重量及体积也略有增加，心率每分钟平均增加10~15次，产后6周才恢复?心搏量(每次心脏排出血量)及每分钟心排量在妊娠32~34周达高峰，分别比未孕时增加30%~40%，一直维持至分娩?心排血量的增加对维持胎儿生长甚为重要，如孕妇患心脏病，心脏排血量减少，致子宫血流量不足，这种情况下，早产或低体重儿的发生率极高，严重影响着新生儿的生命健康?

## 三、怀孕38周血浆纤维蛋白原定增加要紧吗

怀孕后由于血液呈高凝状态，红细胞和血浆都增加，所以孕妇的纤维蛋白原都较正常值高，有助于产后止血；

一般尿常规的检查项目里有白细胞及镜检白细胞个数，管型这几项，没有白细胞酯酶这一项，建议你问问你的产检医生，必要时复查尿常规，复查前洗净外阴，留取中间那一段的尿送做标本. 纤维蛋白原定增加不要紧的，不用担心，祝您好孕！

## 四、怀孕34周羊水的正常值是多少

孕中期羊水深度一般7cm以下

，羊水过多怀疑胎儿畸形，小月份没有羊水过少的标准。

孕晚期羊水深度4—7cm，但是现在子宫和胎儿都还小，羊水也应该相应的少些吧。

只要胎儿没有畸形，不必担心，以后注意按时做孕期保健检查就是了。

我们真诚的希望能够帮助您解决问题，希望您能点击“采纳”，举手之劳，将鼓励我们继续解答其他朋友的问题。

## 五、孕34周 甘胆酸CG偏高

甘胆酸CG偏高，说明胎儿在子宫内可能会出现缺氧的可能，一般医生都会给你打吊瓶，你现在已经是孕晚期了，还是尽量听从医生的安排，为了肚子里小生命！

## 六、您好！我今年28岁，现怀孕12周，做血清检查，数据如下：

没什么问题吧，都是低风险呀！16周后有胎动了，自己要学会数数胎动，睡觉尽量左侧，虽然压迫自己的心脏，但是能为胎儿提供更好的生存环境。

利于胎儿的营养吸收。

## 参考文档

[下载：孕34周血浆量比未孕时增加多少.pdf](#)

[《二级市场高管增持的股票多久能卖》](#)

[《股票合并后停牌多久》](#)

[《今天买的股票多久才能卖》](#)

[《蜻蜓点睛股票卖出后多久能取出》](#)

[《董事买卖股票需要多久预披露》](#)

[下载：孕34周血浆量比未孕时增加多少.doc](#)

[更多关于《孕34周血浆量比未孕时增加多少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/44331550.html>