

为什么站着量血压比坐着低|血压很低，是什么原因造成的，会出现什么症状，怎么解决-股识吧

一、血压很低，是什么原因造成的，会出现什么症状，怎么解决

血压低很容易治的，我血压比你低，30-----70几，有眩晕症，低严重什么都干不了。

连走路都会摔跤，有个偏方，用7个国光苹果皮和7个大枣煮水，调上红糖和蜂蜜喝，几天就好，平时在注意吃补血的东西就没事了

二、坐着和躺下血压为什么不一样?

这个解释起来很复杂。

1、因为坐着时，臀部和大腿部的压强大于躺着时，此部分血管不如正常情况饱满，血液对它的压力便会转移到全身，顾此时量血压的胳膊会比躺着时要稍高（理论上是这样的，但不会高多少的）。

2、坐着和躺着时，心脏所处的位置相对于仪器来说是不一样的，应该是坐着时的血压要稍大于躺着时。

3、两个姿势下，血液的动能和重力势能转化的程度不一样，故而对血管壁的压力也不一样。

 ;

 ;

高中时我是物理帝，所以希望我的解释能解开你的疑惑。

不谢.....还有，我现在在做五谷养生，有需要可以@我。

三、为什么在家量的血压比在医院量的低

那要看你是怎么去医院的啊 运动过后 血压会出现升高的现象

还有就是血压计的不同也会导致 一般医院用的水银柱的血压计要准确一点

四、站，躺，坐时候血压的差别.

你的疑问是因为你对血压的不了解造成的。

血压是血液对血管的压力。

人在躺着时，心脏把血液输送到全身就不费力，用相对小的压力就可以把血液输送到全身，此时测到的血压就相对低；

而人在坐着或站着时，由于地球的重力作用，心脏就需加大压力才能把血液输送到全身，此时测到的血压就相对高。

临床测定的血压是：人在坐位时，手臂与心脏在同一水平面测的血压为参照的。

血压有收缩压和舒张压两项内容。

五、血压偏低是怎么回事？

一些病人因为对低血压认识不足，把低血压所致的脑和全身供血不足造成的头晕、头痛、怕冷、四肢无力等症状，误认为是感冒、发热、脑动脉硬化、神经痛或其他疾病，进行自我治疗。

这样做，往往既耽误了病情，又给患者造成了不必要的经济和心理负担。

其实，低血压病人只要到医院内科就诊，医生通过询问病史、测量血压多可作出诊断。

必要时可通过实验室检查和特殊检查确诊。

什么叫低血压一般成人测量上臂肱动脉血压低于90/60mmHg(12/8kpa)时，称做低血压。

如果血压偏低但不伴有心、脑、肾供血不足而出现上面提到的症状者，可以不作为疾病处理。

低血压有哪些类型急性低血压：当因一种或多种病因导致血压从正常或较高水平突然下降到明显低于正常范围时，称急性低血压，即临床上所说的休克。

慢性低血压：指血压持续达到或低于90/60mmHg(12/8kpa)，有以下三种类型：原发性(体质性)低血压：由于体质或者遗传等原因引起的血压降低，并且出现头晕、头痛、四肢无力等供血不足的症状。

20~40岁女性多见。

特发性(体位性)低血压：指原因不明的低血压。

老年人易患此病。

继发性(体位性)低血压：指继发于其他疾病的低血压。

这种低血压病因复杂，如神经系统疾病、内分泌疾病、慢性消耗性疾病、营养代谢障碍、心血管疾病、血容量不足，以及其他如使用了某些药物等，都可能引起低血压。

低血压要根据病因治疗低血压患者，首先应请医生帮助确定病因，然后对因治疗。部分患者可在医生指导下使用 α -受体激动剂，也可请中医辨证施治。

低血压患者平时应注意什么 患者从躺位、蹲位和坐位转为站立位的过程中动作要缓慢，以免造成脑突然供血不足。

尽量穿偏紧的衣裤和弹力袜子，以帮助血液回流。

饮食可偏咸，多喝开水，以增加血容量。

锻炼时避免出汗，冲凉时避免水温过高，以防血管扩张，血压下降。

正常血压，夏天血管扩张可以导致血压降低有无一段时间胸闷，等情况，建议去医院查一下.除外冠心病心梗.

六、为什么我平躺测量血压和坐着测量血压值不一样，躺着正常，坐着高压140，低压90

坐着与躺着的血压即便有一点偏差，但差的不会太多的。

你这个已经是临界高血压了，所以建议你目前继续观察你的血压。

最好坐着量。

躺着呢，全身会相对比较放松，所以血压可能会比坐着偏低一些。

七、为什么在家量的血压比在医院量的低

那要看你是怎么去医院的啊 运动过后 血压会出现升高的现象

还有就是血压计的不同也会导致 一般医院用的水银柱的血压计要准确一点

八、低血压是站着好还是坐着比较好

低血压的病人不能久站 但也不能久坐 更不能久蹲 尤其是久蹲后不要快速站起 以免晕倒 你坐久都会晕倒 看来你的体质很差了 这样再挑食的话你的病情会更重 建议你用点药吧 静脉给药效果会明显些 然后从现在开始要多吃东西

一次吃的少可以多次进食 只有身体好才能减轻病情。

另外还要进行运动 运动强度要循序渐进从轻微的活动开始

坚持一段时间会感觉有明显的改善的。

九、为什吗在家量的血压要比去医院量的低？

那要看你是怎么去医院的啊 运动过后 血压会出现升高的现象
还有就是血压计的不同也会导致 一般医院用的水银柱的血压计要准确一点

参考文档

[下载：为什么站着量血压比坐着低.pdf](#)

[《股票交易最快多久可以卖出》](#)

[《北上资金流入股票后多久能涨》](#)

[《德新交运股票停牌多久复牌》](#)

[下载：为什么站着量血压比坐着低.doc](#)

[更多关于《为什么站着量血压比坐着低》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/49426810.html>