

怎么量体温比较准！怎样测量体温最标准-股识吧

一、体温检测如何更快更准？

买测试直肠的温度表。

直肠的温度最接近身体真是温度常见测体温的温度计有三种，一种是测腋窝温度，这是最简单也是最不准确的，还有一种是测口腔温度，操作较方便，测量较准确，还有一种就是测直肠的温度了，这是操作最难但最准确的具体操作看说明书

二、如何用红外线体温计给婴儿测体温最准确

儿童量体温最好不要用红外的，安全点，还是用电子的好，如果家庭用的话，可以用水银探热针

三、小孩体温怎么测量比较准确

1.口腔测量：先把体温表的水银柱甩到35度以下，然后把水银端放到口内舌下含紧。

注意不能让宝宝用牙去咬。

2.腋下测量：水银柱甩到35度以下，将体温表放在腋下。

注意：手臂要夹紧。

口腔测量可以和腋下测量用一个体温表。

3.肛门测量：水银柱甩到35度以下，在肛表水银端涂点油轻轻插入肛门不能用力。

注意：肛门测量有专用的肛表。

四、怎样测量体温最标准

体温计测量时间：测量体温有多种方式，测量的时间各不相同：腋下测量，测温7-10分钟取出。

正常腋下体温一般平均为36-37 。

肛门内测量，3-5分钟后取出，肛门体温的正常范围一般为36.8-37.8 。

口腔内测量，3分钟后取出，一般成人正常口腔体温在36-37 之间，小儿可高0.5。

五、体温应该怎么量

量体温还真的是要注意方法的，这阵子我量体温都是醒来量，时间没有固定，测出来的效果跟山峰一样起伏，有时候作息不同也会得到不同的体温，比如像我要是头天午睡时间久了，第二天早上的体温就会高一些，很明显。

然后测之前，测的时候难免翻身，有一些动作，感觉体温就不怎么准确了。所以最好是闹钟定时，一闹醒来就拿体温表量，不要翻身，更不要起床喝水，尿尿神马的。

以最小幅度动作拿体温表，量的时候每次尽量放在口腔舌下的同一位置，闭紧嘴巴，还要保证每天的作息情况比较规律，这样测得的体温才比较有参考价值。

楼主加油！

参考文档

[下载：怎么量体温比较准.pdf](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《社保基金打新股票多久上市》](#)

[《股票k线看多久》](#)

[下载：怎么量体温比较准.doc](#)

[更多关于《怎么量体温比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/27111576.html>