

量血压时为什么左边比右边量的低、血压一边高一边低怎么办？-股识吧

一、量血压应该量左胳膊还是右胳膊？

严格讲需要两支胳膊都测

二、人为什么一只手血压高另一只手血压低

你好，这是正常的，一般右手比左手略高。
希望我的回答能够帮助到你，谢谢

三、我的左臂血压正常右臂血压很低是怎么回事

正常情况下，右臂血压较左臂血压更接近主动脉压，所以，测血压首选右臂。
正常人右臂比左臂血压高5 - 10mmhg、下肢比上肢高20 - 40mmhg。

优势侧上肢血压较高。

右撇子人多为右侧高，左撇子人左侧高。

优势侧上肢的臂围较大，用同样宽的袖带，测出的血压值就高。

也可见于多发性大动脉炎锁骨下动脉闭塞，远端的椎动脉回流所致。

先天性动脉畸形，锁骨下动脉窃血的患者左上肢所测血压较低。

脑卒中患者病侧上肢的血压可较高或较低。

所以，正确的做法是：测血压时，首先要测量双侧上肢的血压，以确定两上肢血压的差异。

如果一侧上肢所测血压较高，则以后要用该侧上肢测量血压。

被测量者最好坐于有靠背的座椅上，裸露出右上臂，上臂肘部、心脏、水银柱“0”点应基本在同一水平。

特殊情况下可以取卧位或站立位。

(并查看水银柱应在0点。

)

四、血压一边高一边低怎么办？

我的右边手臂150，高压，低压85，左手臂120，85

五、左右血压有差哪个为准

右边为准

六、为什么测血压的时候2只手的测量结果差很多？

首先要知道血压是血管弹性决定！血管硬化或者狭窄程度不同，出现的血压高度也会不同。

总之，高低血压病人都属于心脏问题，严格讲就是心脏病。

本人认为高血压、低血压、心慌胸闷、心律失常、心梗、血栓、脑溢血等，通属于心脏病症状；

只是早期、中期或者晚期的不同，出现的症状也会不同。

参考文档

[下载：量血压时为什么左边比右边量的低.pdf](#)

[《股票15点下单多久才能交易》](#)

[《股票委托多久才买成功》](#)

[《大冶特钢股票停牌一般多久》](#)

[《股票除权除息日多久》](#)

[《农民买的股票多久可以转出》](#)

[下载：量血压时为什么左边比右边量的低.doc](#)

[更多关于《量血压时为什么左边比右边量的低》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/40193184.html>