

为什么医院量血压比在家里高 - 为什么早上量着血压正常但晚上量的时候就高-股识吧

一、为什么在医院量的血压和自己在家里量的血压差好多

你自己的仪器不准或者测量方法不对

二、血压值偏高求回答

 ;

您好：人体的血压本来就是处于动态变化当中，不同医生测量确实也可能会有一定误差，这也正是为什么诊断高血压至少要求由不同医生不同时间测量三次以上达到高血压标准。

测量还是以水银柱血压计由医生测量更为准确。

建议您可到当地医院心血管内科诊治。

三、为什么在家里测量血压和在医院测不一样啊，是不是血压计有问题啊，

展开全部电子的血压计或许是有一定差异，如果是液柱那种最大可能就是您操作方式的问题了，注意心脏和仪器的水平，注意脉搏绑带的位置，注意听诊器的位置。多练就好了。

四、为何测血压第一次比随后几次总高出10。

病情分析：您好，测量血压时候要心平气和，您刚坐在那肯定是刚有过活动，所以血压偏高。

五、为什么早上量着血压正常但晚上量的时候就高

一天中血压本来就是波动的，往往最高的时候是早上。

六、为什么在家测血压正常，一去医院血压就高

首先看你用的仪器，如果是电子血压计，它的数值就会波动，不是很准确，就是水银血压计测量但如果你是饭后或者运动完后测，它和你平时量也会有差别。医院里一般也用原始的水银血压计，这个比较准确，误差小，但是差别肯定有，关键看你每次测量的时间、状态是否一致。

七、我在医院测量血压就会很紧张有时高压180。但是在家里测量却几乎都在120/78左右。这有可能是高血压吗？

不是，是因为你太紧张了。
到医院检查的时候，先休息平复一下自己的心情，然后再测！因为血压一紧张就会变高！

八、为什么用鱼跃血压计在家测得的血压值和医院的测量结果不一样？

将手腕带下面部分拉紧系好，并注意不要留有缝隙，如手腕带捆绑不正确，将无法精确测量。

B、测量中姿势是否正确：血压实质上是一种液体压力。

将手举起测得的血压值会低，将手垂下测得的血压值会高。

因此，测量时请务必坐正，尽量保证每次测量时，头顶至心脏的垂线距离概略相等，并使手腕带与心脏位置同高。

C、测量中是否有说话或移动？活动、说话、饮酒、饥饿、饱餐、疲劳、紧张、心情不畅等，都会引血压的变化。

因此，请选择好测量时机，并在整个测量过程中，务必自然放松，尽量不要活动和

说话。

D、手掌不要用力，自然张开，不要握拳。

九、为什么在医院量的血压和自己在家里量的血压差好多

你自己的仪器不准或者测量方法不对

参考文档

[下载：为什么医院量血压比在家里高.pdf](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《股票多久能涨起来》](#)

[《公司上市多久后可以股票质押融资》](#)

[《股票发债时间多久》](#)

[《农民买的股票多久可以转出》](#)

[下载：为什么医院量血压比在家里高.doc](#)

[更多关于《为什么医院量血压比在家里高》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/49024146.html>